



Χρόνια λήψη ασπιρίνης (και εντεροδιαλυτής)
ή θεραπεία με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΑΣΦ)

Έλεγχος για H.p.

H.p. (+)

H.p. (-)

Θεραπεία εκρίζωσης H.p.

Αναστολέας της αντλίας
πρωτονίων 1x1, για όσο
διάστημα λαμβάνει ΜΑΣΦ

Αναστολέας της αντλίας
πρωτονίων 1x1, για όσο
διάστημα λαμβάνει ΜΑΣΦ

Επεξηγήσεις

- (1) Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (ΑΑΠ)
 - Ομεπραζόλη, παντοπραζόλη, ραμπεπραζόλη, λανσοπραζόλη, εσομεπραζόλη
 - Δεν έχει αποδειχθεί υπεροχή ενός από τους ανωτέρω ΑΑΠ στα σχήματα εκρίζωσης Η.ρ.
 - Στο έλκος στομάχου ο ΑΑΠ συνεχίζεται για 1 μήνα, ενώ στο έλκος δωδεκαδακτύλου αρκεί μόνο η θεραπεία εκρίζωσης του Η.ρ.
- (2) Στο έλκος στομάχου πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται βιοψίες από το έλκος για τον αποκλεισμό κακοήθειας
- (3) Δεκαήμερο τριπλό σχήμα εκρίζωσης
 - ΑΑΠ 1x2, Αμοξικιλίνη 1gx2, Κλαρυθρομυκίνη 500mgx2
 - Σε αλλεργία στην πενικιλίνη, μετρονιδαζόλη 500mgx3 ή λεβοφλοξασίνη 500mgx2
- (4) ιστολογική εξέταση βιοψιών στομάχου ή δοκιμασία εκπνοής με ουρία σεσημασμένη με C13 ή εξέταση κοπράνων για αντιγόνα έναντι του Η.ρ.
- (5) Δεκαήμερο τροποποιημένο τριπλό σχήμα εκρίζωσης
 - ΑΑΠ 1x2, Αμοξικιλίνη 1gx2, λεβοφλοξασίνη 500mgx2
- (6) Δεκατετραήμερο τετραπλό σχήμα εκρίζωσης
 - ΑΑΠ 1x2, άλατα βισμούθιου (Colloidal bismuth subcitrate 120mg) 2x2, μετρονιδαζόλη 500mgx3, Κλαρυθρομυκίνη 500mgx2