

Μηνιγγίτιδα

(Υπεύθυνος : Μ Λαζανάς

Ανήκει στην κατηγορία της επείγουσας ιατρικής και γι' αυτό απαιτείται ταχεία διάγνωση και άμεση θεραπευτική αγωγή.

Διακρίνεται σε βακτηριακή μηνιγγίτιδα (*Streptococcus pneumoniae*, *N. meningitidis*, *H. influenzae*) και άσηπτη (κυρίως ιογενή).

Απαιτείται άμεση έναρξη αντιμικροβιακής αγωγής (ceftriaxone 2gr iv) ακόμα και επί υποψίας της νόσου, ιδιαίτερα εάν καθυστερεί η μεταφορά του ασθενούς σε νοσοκομείο ή η διενέργεια ΟΝΠ ή η CT εγκεφάλου. Συνιστάται πριν ή συγχρόνως με την χορήγηση της αντιμικροβιακής αγωγής δεξαμεθαζόνη 0,15mg/kg i.v.

Το ανωτέρω αποτελεί περίληψη των κατευθυντηρίων οδηγιών για τη διάγνωση και την εμπειρική θεραπεία των λοιμώξεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

Συντονιστής: Μ.Κ. Λαζανάς

Έκδοση ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.-Ε.Ε.Α. 2011