

ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΛΛ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ADULT STILL'S DISEASE)

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

1^{ης} επιλογής*

- Πρεδνιζολόνη per os (0.5-1 mg/kg) /ημέρα ή μεθυλπρεδνιζόνη (ανάλογη δοσολογία)
+
- Μεθοτρεξάτη: 7.5-20 mg/ εβδομάδα

Εάν υπάρχει δυσανεξία στην Μεθοτρεξάτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά:

- Λεφλουνομίδη 20mg/ ημέρα ή
- Κυκλοσπορίνη 2.5mg/kg/ημέρα
- Azathioprine 2-3mg/kg/ημέρα

2^{ης} επιλογής*

Σε ασθενείς όπου η νόσος δεν ελέγχεται με συνδυασμό κορτικοειδών και Μεθοτρεξάτης ή άλλου ανοσοτροποποιητικού μπορεί να προστεθεί θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες όπως:

1. Anakinra , 100mg υποδορίως ημερησίως
ή
2. Tocilizumab , 8mg/kg (max 800mg) IV κάθε μήνα
ή
3. Infliximab 3-5mg/kg IV κάθε 2 μήνες
ή
4. Etanercept 50mg υποδορίως κάθε βδομάδα
ή
5. Adalimumab 40mg υποδορίως κάθε 2 βδομάδες
ή
6. Rituximab- 2 κύκλοι IV 1000mg με μεσοδιάστημα 15 ημερών

**Τα δεδομένα προκύπτουν από περιγραφή μεμονωμένων περιστατικών ή συρροή περιστατικών διότι δεν υπάρχουν ελεγχόμενες μελέτες.*