



Αρ. Πρωτοκόλλου 19	Έκδοση 1 ^η	Σεπτέμβριος 2011	Σελίδα 1 από 2
--------------------	-----------------------	------------------	----------------

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΥΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΥΣΤΕΩΣ

Συντάχθηκε από ομάδα εργασίας	Αντωνίου Φ. Βελλής Κ. Θεοχάρη-Μπήδιου Ζ. Καρύδα Κ. Κοσμίδου Μ.	Λαλοπούλου Μ. Μοιρασγεντή Μ. Περπερίδου Ο. Σιάπκας Ε. Τούφας Κ.	Τσιούλα Χ. Χαρούπα Σ. Χονδροματίδου Μ.
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας	Κοκώνη Κουτσιαντά - Ζαμπόκα		
Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας	Φανή Αθανασιάδου- Πιπεροπούλου Καθηγήτρια Παιδιατρικής Α.Π.Θ		
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου	Δημήτριος Γρέκας Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ		
Διοικητής & Πρόεδρος Δ.Σ.Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ	Γεώργιος Βέργουλας		

Απόφαση Δ.Σ: Συνεδρίαση 19^η της 30/08/2011
Θέμα 49^ο

Κάθε αντίγραφο του παρόντος εγγράφου ισχύει μόνο
όταν φέρει την σφραγίδα της πηγής προέλευσης:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ

ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Γάντια μιας χρήσης	Οφθαλμικά ταμπόν ή γάζες
Λαβίδα για κλαμπάρισμα	Σύριγγες (5ml ή 10ml)
2% γλουκονικής χλωρεξιδίνης σε 70% ισοπροπυλικής αλκοόλης	Κατάλληλο δοχείο για ούρα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
1. Συστηθείτε, επιβεβαιώστε την ταυτότητα του ασθενή, εξηγήστε του τη διαδικασία και εξασφαλίστε την συγκατάθεση του.	Για να ταυτοποιήσετε σωστά τον ασθενή και να αποκτήσετε την συγκατάθεση του
2. Κλαμπάρετε με μια βαλβίδα τον αυλό του ουροσυλλέκτη, εάν είναι απαραίτητο, ακριβώς κάτω από το σημείο όπου θα πάρετε το δείγμα, για 15 λεπτά	Για να σταματήσει η ροή των ούρων και να συλλεχθεί επαρκής ποσότητα ούρων. Η λήψη γίνεται από τον ουροσυλλέκτη και όχι από τον ουροκαθετήρα για αποφυγή λοιμώξεων.

3. Καθαρίστε το σημείο από όπου θα γίνει η συλλογή με 2% γλουκονικής χλωρεξιδίνης σε 70% ισοπροπυλικής αλκοόλης	Για πρόληψη των λοιμώξεων.
4. Αναρροφήστε την επιθυμητή ποσότητα ούρων.	Ανάλογα με τον τύπο της εξέτασης.
5. Εάν χρησιμοποιήσατε λαβίδα για το κλαμπάρισμα, αφαιρέστε τη.	Για να αποκατασταθεί το κλειστό κύκλωμα απομάκρυνσης ούρων.
6. Μεταφέρετε το δείγμα των ούρων στο κατάλληλο δοχείο.	Ανάλογα με την εξέταση μπορεί να χρειάζεται αποστειρωμένο ή μη δοχείο.

Βιβλιογραφία

Endacott, R., Jevon, P. & Cooper, S. (eds) 2009, Clinical Nursing Skills, Oxford University Press, Oxford, New York, pp. 457-459.