



Αρ. Πρωτοκόλλου 30	Έκδοση 1 ^η	Σεπτέμβριος 2011	Σελίδα 1 από 2
--------------------	-----------------------	------------------	----------------

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ

Συντάχθηκε από ομάδα εργασίας	Θεοχάρη Μπήδιου Ζ. Κουπαράνης Α. Πολίτου Α.
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας	Κοκώνη Κουτσιαντά - Ζαμπόκα
Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας	Φανή Αθανασιάδου- Πιπεροπούλου Καθηγήτρια Παιδιατρικής Α.Π.Θ
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου	Δημήτριος Γρέκας Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ
Διοικητής & Πρόεδρος Δ.Σ Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ	Γεώργιος Βέργουλας

Απόφαση Δ.Σ: Συνεδρίαση 19^η της 30/08/2011
Θέμα 49^ο

Κάθε αντίγραφο του παρόντος εγγράφου ισχύει μόνο
όταν φέρει την σφραγίδα της πηγής προέλευσης:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ

ΥΛΙΚΑ

1. 20ml xylocaine 2%
2. 10.000i.u. heparine
3. Ιματισμός αποστειρωμένος
4. Γάζες
5. 1lit 0.9 N/S
6. 100ml σκιαστικό
7. 50ml ιωδιούχο διάλυμα (betadine)
8. Σύριγγες
9. Σύρμα 0,35/150cm J
10. Θηκάρια (6F, 7F, 12F, 18F)
11. Αδιάβροχα πεδία για χειριστήρια και μολυβδύαλο

	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1.	Παραλαβή ασθενή, ταυτοποίηση στοιχείων	Για αποφυγή λάθους
2.	Προετοιμασία (τοποθέτηση στο κρεβάτι, ευπρεπισμός, φλεβοκέντηση – ορός iv, σύνδεση με ECG, ψυχολογική ενθάρρυνση)	Για την διενέργεια της βαλβιδοπλαστικής Για μείωση του άγχους
3.	*Γενική αναισθησία, διασωλήνωση	Για τη διενέργεια της επέμβασης
4.	*Αποστείρωση πεδίου (χλωρεξιδίνη, ιωδιούχο μείγμα) βουβωνικής περιοχής και «σκέπασμα» ασθενή	Δημιουργία χειρουργικού πεδίου
5.	Στρώσιμο χειρουργικού τραπεζιού (2 άτομα)	Για τη διασφάλιση άσηπτων συνθηκών
6.	*Διενέργεια διοισοφάγειου υπέρηχου	Για την εντόπιση του ελλείματος και καθοδήγηση της ομπρέλας
7.	Χορήγηση φαρμάκων, σερβίρισμα επιπλέον υλικών (επιθέματος – ‘ομπρέλας’)	Ανάλογα με τις ανάγκες της επέμβασης και τα συμπτώματα του ασθενή
8.	Παρακολούθηση ζωτικών σημείων του ασθενή (κλινικά + monitor)	Παροχή πρώτων βοηθειών (εφόσον χρειαστεί)
9.	*Αποδιασωλήνωση του ασθενή και αφύπνιση	Όσο το δυνατόν λιγότερη διάρκεια γενικής αναισθησίας
10.	Σταθεροποίηση του θηκαριού, καθαρισμός τραπεζιού, συμμάζεμα χώρου εργαστηρίου Έξοδος ασθενή από το εργαστήριο	Λόγω λήψης αντιπηκτικών (ηπαρίνη) Προετοιμασία χώρου για την υποδοχή νέου αρρώστου
11.	Καθ’όλη τη διάρκεια της βαλβιδοπλαστικής παραμένουμε εντός του εργαστηρίου (με προστατευτική μολύβδινη ποδιά)	Για έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών (κοιλιακή μαρμαρυγή, διασωλήνωση, ΚΑΡΠΑ), για ψυχολογική ενθάρρυνση του ασθενή καθώς και για το σερβίρισμα του αποστειρωμένου υλικού προς τους ιατρούς