

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Εξέταση	Είδος δείγματος	Φιαλίδιο	Απαιτούμενη ποσότητα	Προετοιμασία ασθενούς	Χρόνος παράδοσης στο	Χρόνος απάντησης	Παρατηρήσεις
Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	ΟΧΙ	< 6 h	1 μέρα εργάσιμη	
Ανοσοαφαίρεση πρωτεϊνών ορού	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	ΟΧΙ	< 6 h	1 μέρα εργάσιμη	
Ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών ορού	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	ΟΧΙ	< 6 h	7 εργάσιμες ημέρες	
IgG, IgA, IgM ανοσοσφαιρίνες ορού	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	1 μέρα εργάσιμη	
Υποτάξεις IgG	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	<6 h	7 εργάσιμες ημέρες	
κ και λ ελαφρές αλυσεις ούρων	ούρα		4 ml			1 εργάσιμη ημέρα	
κ και λ ελαφρές αλυσεις ορού	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	1 μέρα εργάσιμη	
Ελεύθερες κ και λ ελαφρές αλυσεις ορού	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	1 μέρα εργάσιμη	
Ανοσοσφαιρίνη IgE ορού	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	1 μέρα εργάσιμη	

IgG index και προσδιορισμός ολιγοκλωνικών IgG ζωνών στο ENY	ορός & ENY	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml & τουλάχιστον 0,5 ml ENY του ίδιου 24ώρου	νηστεία	< 6 h	20 μέρες εργάσιμες		
Παράγων C3	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 3 h	1 μέρα εργάσιμη		
Παράγων C4	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 3 h	1 μέρα εργάσιμη		
Ρευματοειδής παράγων	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	1 μέρα εργάσιμη		
CRP (C-Αντιδρώσα πρωτεΐνη)	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	1 μέρα εργάσιμη		
HPT (Απποσφαιρίνη)	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	ΟΧΙ	< 6 h	1 μέρα εργάσιμη		
CER (Σερουλοπλασμίνη)	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	1 μέρα εργάσιμη		
AAT (A1 αντιθρυψίνη)	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	1 μέρα εργάσιμη		
ASTO	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	3 μέρες εργάσιμες		
B2 μικροσφαιρίνη	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	1 μέρα εργάσιμη		
CRP hs (C-Αντιδρώσα πρωτεΐνη υψηλής ευαισθησίας)	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	1 μέρα εργάσιμη		
Προκαλσιτονίνη	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	1 μέρα εργάσιμη		

CD4+ T-λεμφοκύτταρα	ολικό αίμα	K3 EDTA	2 ml (1 σωληνάριο γενικής αίματος)	OXI	< 3 h	1 μέρα εργάσιμη	Παραλαβή δειγμάτων Τρίτη-Πέμπτη	
Προσδιορισμός υποπληθυσμών λεμφοκυττάρων	ολικό αίμα, μυελός, ENY, Ασκιτικό, Πλευριτικό	K3 EDTA ή ηπαρίνη	2 ml (1 σωληνάριο γενικής αίματος)	OXI	< 6 h	2 ημέρες εργάσιμες	Αποστολή δειγμάτων κατόπιν ραντεβού	
Ανοσοφαινότυπος κυττάρων οξείας λευχαιμίας	ολικό αίμα, μυελός, Ασκιτικό, Πλευριτικό	K3 EDTA ή ηπαρίνη	4 ml (2 σωληνάκια γενικής αίματος)	OXI	< 6 h	5 ημέρες εργάσιμες	Προσυνεννόηση με το Εργαστήριο	
Ανοσοφαινότυπος χρονίων λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων/ Λεμφωμάτων Β, Τ	ολικό αίμα, μυελός, Ασκιτικό, Πλευριτικό	K3 EDTA ή ηπαρίνη	4 ml (2 σωληνάκια γενικής αίματος)	OXI	< 6 h	5 ημέρες εργάσιμες	Αποστολή δειγμάτων κατόπιν ραντεβού	Τηλ. 2313303542 - 2313303858
Τυποποίηση οικογενειών υποδοχέα Τ-λεμφοκυττάρων (TCR)	ολικό αίμα	K3 EDTA	2 ml (1 σωληνάριο γενικής αίματος)	OXI	< 6 h	5 ημέρες εργάσιμες	Αποστολή δειγμάτων κατόπιν ραντεβού	Τηλ. 2313303542 - 2313303859
Διαγνωστική διερεύνηση πολλαπλού μυελώματος	ολικό αίμα, μυελός των οστών	K3 EDTA	2 ml (1 σωληνάριο γενικής αίματος)	OXI	< 6 h	5 ημέρες εργάσιμες	Αποστολή δειγμάτων κατόπιν ραντεβού	Τηλ. 2313303542 - 2313303860

Διαγνωστική διερεύνηση για παρουσία κλώνου PNH	ολικό αίμα	K3 EDTA	2 ml (1 σωληνάρι ο γενικής αίματος)	ΟΧΙ	< 6 h	5 ημέρες εργάσιμες	Αποστολή δειγμάτων κατόπιν ραντεβού	Τηλ. 2313303542 - 2313303861
Αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA) (IFA)- Συμπεριλαμβάνονται τα αντικεντρομεριδιακά (ACA)	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	7 ημέρες εργάσιμες	Συντομότερος χρόνος απάντησης για αρνητικό δείγμα	
Αντι-ds DNA αντισώματα (ELISA)	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	7 ημέρες εργάσιμες		
Αυτοαντισώματα έναντι μιτοχονδρίων (AMA) (IFA)	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	7 ημέρες εργάσιμες		
Αυτοαντισώματα έναντι λείων μυϊκών ινών (SMA) (IFA)	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	7 ημέρες εργάσιμες		
Αντισώματα έναντι μικροσωμίων ήπατος- νεφρών (LKM) (IFA)	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	7 ημέρες εργάσιμες		
Αντι-dsDNA αντισώματα (IFA)	ορός	Χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	<6 h	7 εργάσιμες ημέρες		
Αυτοαντισώματα έναντι τοιχωματικών κυττάρων στομάχου (PCA) (IFA)	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	7 ημέρες εργάσιμες		

Αντισώματα έναντι διαλυτών αντιγόνων του πυρήνα (ENA SCREEN)	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	7 ημέρες εργάσιμες		
Αντισώματα έναντι Sm-RNP (ENA)	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	15 ημέρες εργάσιμες		
Αντισώματα έναντι Sm (ENA)	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	15 ημέρες εργάσιμες		
Αντισώματα έναντι Ro, SSA (ENA)	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	15 ημέρες εργάσιμες		
Αντισώματα έναντι La, SSB (ENA)	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	15 ημέρες εργάσιμες		
Αντισώματα έναντι Σκληροδέρματος (Scl- 70)	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	15 ημέρες εργάσιμες		
Αντισώματα έναντι Jo-1	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	15 ημέρες εργάσιμες		
Αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης IgG	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	7 ημέρες εργάσιμες		
Αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης IgM	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	7 ημέρες εργάσιμες		
Αντισώματα έναντι β2 γλυκοπρωτεΐνης I (IgG)	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	7 ημέρες εργάσιμες		
Αντισώματα έναντι β2 γλυκοπρωτεΐνης I (IgM)	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	7 ημέρες εργάσιμες		
Αντισώματα έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης (Anti-tTG) IgG - IgA	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	15 ημέρες εργάσιμες		

Αντιγλοιαδινικά αντισώματα (AGA) IgG - IgA	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	15 ημέρες εργάσιμες		
Αντισώματα έναντι ενδομυΐου (EMA)	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	15 ημέρες εργάσιμες		
C1 INH – Αναστολέας C1	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	20 ημέρες εργάσιμες		
CIC (κυκλοφορούντα ανοσοσυμπλέγματα)	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	20 ημέρες εργάσιμες		
Αντισώματα έναντι CCP	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	20 ημέρες εργάσιμες		
Αντισώματα έναντι GBM	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	1 εργάσιμη ημέρα	Προσυνεννόηση με το εργαστήριο	
Αντισώματα έναντι κυτταροπλάσματος των ουδετεροφίλων (C-ANCA/PR3)	ορός	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	7 ημέρες εργάσιμες		
Αντισώματα έναντι μυελοπεροξειδάσης των ουδετεροφίλων (P-ANCA/MPO)	ολικό αίμα	χωρίς αντιπηκτικό	4 ml	νηστεία	< 6 h	7 ημέρες εργάσιμες		



