



Αρ. Πρωτοκόλλου 27	Έκδοση 1 ^η	Σεπτέμβριος 2011	Σελίδα 1 από 2
--------------------	-----------------------	------------------	----------------

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Συντάχθηκε από ομάδα εργασίας	Θεοχάρη Μπήδιου Ζ. Κουπαράνης Α. Πολίτου Α.
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας	Κοκώνη Κουτσιαντά - Ζαμπόκα
Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας	Φανή Αθανασιάδου- Πιπεροπούλου Καθηγήτρια Παιδιατρικής Α.Π.Θ
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου	Δημήτριος Γρέκας Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ
Διοικητής & Πρόεδρος Δ.Σ Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ	Γεώργιος Βέργουλας

Απόφαση Δ.Σ: Συνεδρίαση 19^η της 30/08/2011
Θέμα 49^ο

Κάθε αντίγραφο του παρόντος εγγράφου ισχύει μόνο
όταν φέρει την σφραγίδα της πηγής προέλευσης:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ

ΥΛΙΚΑ

1. 20ml xylocaine 2%
2. 20mg nitrolingual
3. 10.000i.u. heparine
4. Ιματισμός αποστειρωμένος
5. 1lit 0.9 N/S
6. 100ml σκιαστικό
7. 50ml ιωδιούχο διάλυμα (betadine)
8. Σύριγγες
9. Καθετήρες (JL4, JR4 PIGTAIL)
10. Σύρμα 0,35/150cm J
11. Θηκάρι (5F, 6F, 7F)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (*ιατρικές πράξεις)		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1.	Παραλαβή ασθενή, ταυτοποίηση στοιχείων	Για αποφυγή λάθους
2.	Προετοιμασία (τοποθέτηση στο κρεβάτι, ευπρεπισμός, φλεβοκέντηση – ορός iv, σύνδεση με ECG, ψυχολογική ενθάρρυνση)	Για την διενέργεια της στεφανιογραφίας Για μείωση του άγχους
3.	*Αποστείρωση πεδίου (χλωρεξιδίνη, ιωδιούχο μείγμα) βουβωνικής περιοχής και «σκέπασμα» ασθενή	Δημιουργία χειρουργικού πεδίου
4.	Στρώσιμο χειρουργικού τραπεζιού (2 άτομα)	Για τη διασφάλιση άσηπτων συνθηκών
5.	*διενέργεια στεφανιογραφίας	
6.	Χορήγηση φαρμάκων, σερβίρισμα επιπλέον υλικών	Ανάλογα με τις ανάγκες της εξέτασης και τα συμπτώματα του ασθενή
7.	Παρακολούθηση ζωτικών σημείων του ασθενή (monitor)	Παροχή πρώτων βοηθειών (εφόσον χρειαστεί)
8.	*Αιμόσταση	Διακοπή αιμορραγίας από το σημείο της παρακέντησης
9.	Πιεστική επίδεση τραύματος (σημείο παρακέντησης) Καθαρισμός τραπεζιού, συμμάζεμα χώρου εργαστηρίου Έξοδος ασθενή από το εργαστήριο	Για αποφυγή νέας αιμορραγίας λόγω μετακίνησης του ασθενή Προετοιμασία χώρου για την υποδοχή νέου αρρώστου
10.	Καθ'όλη τη διάρκεια της στεφανιογραφίας παραμένουμε εντός του εργαστηρίου (με προστατευτική μολύβδινη ποδιά)	Για έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών (κοιλιακή μαρμαρυγή, διασωλήνωση, ΚΑΡΠΑ), για ψυχολογική ενθάρρυνση του ασθενή καθώς και για το σερβίρισμα του αποστειρωμένου υλικού προς τους ιατρούς