



Αρ. Πρωτοκόλλου 28	Έκδοση 1 ^η	Σεπτέμβριος 2011	Σελίδα 1 από 2
--------------------	-----------------------	------------------	----------------

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Συντάχθηκε από ομάδα εργασίας	Θεοχάρη Μπήδιου Ζ. Κουπαράνης Α. Πολίτου Α.
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας	Κοκώνη Κουτσιαντά - Ζαμπόκα
Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας	Φανή Αθανασιάδου- Πιπεροπούλου Καθηγήτρια Παιδιατρικής Α.Π.Θ
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου	Δημήτριος Γρέκας Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ
Διοικητής & Πρόεδρος Δ.Σ Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ	Γεώργιος Βέργουλας

Απόφαση Δ.Σ: Συνεδρίαση 19^η της 30/08/2011
Θέμα 49^ο

Κάθε αντίγραφο του παρόντος εγγράφου ισχύει μόνο
όταν φέρει την σφραγίδα της πηγής προέλευσης:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ

ΥΛΙΚΑ

1.	20ml xylocaine 2%
2.	20mg nitrolingual
3.	10.000i.u. heparine
4.	Ιματισμός αποστειρωμένος
5.	Γάζες
6.	1lit 0.9 N/S
7.	100ml σκιαστικό
8.	50ml ιωδιούχο διάλυμα (betadine)
9.	Σύριγγες
10.	Ράμμα 2 – 0 silk
11.	Σύρμα 0,35/150cm J
12.	Θηκάρι παρακέντησης (κερκιδικής - μηριαίας) 6F, 7F, 8F
13.	Αδιάβροχα πεδία για χειριστήρια και μολυβδύαλο
14.	Συσκευή πληρώσεως μπαλονιού
15.	Οδηγό σύρμα αγγειοπλαστικής
16.	Οδηγό καθετήρα αγγειοπλαστικής

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1.	Παραλαβή ασθενή, ταυτοποίηση στοιχείων	Για αποφυγή λάθους
2.	Προετοιμασία (τοποθέτηση στο κρεβάτι, ευπρεπισμός, φλεβοκέντηση – ορός iv, σύνδεση με ECG, ψυχολογική ενθάρρυνση)	Για την διενέργεια της αγγειοπλαστικής Για μείωση του άγχους
3.	*Αποστείρωση πεδίου (χλωρεξιδίνη, ιωδιούχο μείγμα) βουβωνικής περιοχής και «σκέπασμα» ασθενή	Δημιουργία χειρουργικού πεδίου
4.	Στρώσιμο χειρουργικού τραπεζιού (2 άτομα)	Για τη διασφάλιση άσηπτων συνθηκών
5.	*διενέργεια αγγειοπλαστικής	
6.	Χορήγηση φαρμάκων, σερβίρισμα επιπλέον υλικών (balloon, stents)	Ανάλογα με τις ανάγκες της εξέτασης και τα συμπτώματα του ασθενή
7.	Παρακολούθηση ζωτικών σημείων του ασθενή (monitor)	Παροχή πρώτων βοηθειών (εφόσον χρειαστεί)
8.	*συρραφή θηκαριού	Λόγω χορήγησης αντιπηκτικών (heparine)
9.	Καθαρισμός τραπεζιού, συμμάζεμα χώρου εργαστηρίου Έξοδος ασθενή από το εργαστήριο	Προετοιμασία χώρου για την υποδοχή νέου αρρώστου
10.	Καθ'όλη τη διάρκεια της αγγειοπλαστικής παραμένουμε εντός του εργαστηρίου (με προστατευτική μολύβδινη ποδιά)	Για έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών (κοιλιακή μαρμαρυγή, διασωλήνωση, ΚΑΡΠΑ), για ψυχολογική ενθάρρυνση του ασθενή καθώς και για το σερβίρισμα του αποστειρωμένου υλικού προς τους ιατρούς