



Αρ. Πρωτοκόλλου 29	Έκδοση 1 <sup>η</sup>	Σεπτέμβριος 2011	Σελίδα 1 από 2
--------------------	-----------------------	------------------	----------------

**ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΑΛΒΙΔΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ**

Συντάχθηκε από ομάδα εργασίας	Θεοχάρη Μπήδιου Ζ. Κουπαράνης Α. Πολίτου Α.
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας	Κοκώνη Κουτσιαντά - Ζαμπόκα
Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας	Φανή Αθανασιάδου- Πιπεροπούλου Καθηγήτρια Παιδιατρικής Α.Π.Θ
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου	Δημήτριος Γρέκας Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ
Διοικητής & Πρόεδρος Δ.Σ Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ	Γεώργιος Βέργουλας

Απόφαση Δ.Σ: Συνεδρίαση 19<sup>η</sup> της 30/08/2011  
Θέμα 49<sup>ο</sup>

Κάθε αντίγραφο του παρόντος εγγράφου ισχύει μόνο  
όταν φέρει την σφραγίδα της πηγής προέλευσης:  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ

**ΥΛΙΚΑ**

1.	20ml xylocaine 2%
2.	20μg nitrolingual
3.	10.000i.u. heparine
4.	Ιματισμός αποστειρωμένος
5.	Γάζες
6.	1lit 0.9 N/S
7.	100ml σκιαστικό
8.	50ml ιωδιούχο διάλυμα (betadine)
9.	Σύριγγες
10.	Ράμμα 2 – 0 silk
11.	Σύρμα 0,35/150cm J
12.	Θηκάρι παρακέντησης μηριαίας αρτηρίας (6F, 7F, 8F) X 2
13.	Αδιάβροχα πεδία για χειριστήρια και μολυβδύαλο
14.	Οδηγό σύρμα βαλβιδοπλαστικής 0,35"/260cm J super stiff,
15.	Καλώδιο προσωρινής βηματοδότησης
16.	Καλώδιο σύνδεσης με τον εξωτερικό βηματοδότη
17.	Doramine 250mg iv
18.	Οδηγό καθετήρα βαλβιδοπλαστικής

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1.	Παραλαβή ασθενή, ταυτοποίηση στοιχείων	Για αποφυγή λάθους
2.	Προετοιμασία (τοποθέτηση στο κρεβάτι, ευπρεπισμός, φλεβοκέντηση – ορός iv, σύνδεση με ECG, ψυχολογική ενθάρρυνση)	Για την διενέργεια της βαλβιδοπλαστικής Για μείωση του άγχους
3.	*Αποστείρωση πεδίου (χλωρεξιδίνη, ιωδιούχο μείγμα) βουβωνικής περιοχής και «σκέπασμα» ασθενή	Δημιουργία χειρουργικού πεδίου
4.	Στρώσιμο χειρουργικού τραπεζιού (2 άτομα)	Για τη διασφάλιση άσηπτων συνθηκών
5.	*διενέργεια βαλβιδοπλαστικής	
6.	Χορήγηση φαρμάκων, σερβίρισμα επιπλέον υλικών (balloon)	Ανάλογα με τις ανάγκες της εξέτασης και τα συμπτώματα του ασθενή
7.	Παρακολούθηση ζωτικών σημείων του ασθενή (κλινικά + monitor)	Παροχή πρώτων βοηθειών (εφόσον χρειαστεί)
8.	Βηματοδότηση κατά τη διάρκεια φουσκώματος του μπαλονιού (180bpm)	Για μείωση του όγκου παλμού και σωστή τοποθέτηση του μπαλονιού
9.	Σταθεροποίηση του θηκαριού, καθαρισμός τραπεζιού, συμάζεμα χώρου εργαστηρίου Έξοδος ασθενή από το εργαστήριο	Λόγω λήψης αντιπηκτικών (ηπαρίνη) Προετοιμασία χώρου για την υποδοχή νέου αρρώστου
10.	Καθ'όλη τη διάρκεια της βαλβιδοπλαστικής παραμένουμε εντός του εργαστηρίου (με προστατευτική μολύβδινη ποδιά)	Για έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών (κοιλιακή μαρμαρυγή, διασωλήνωση, ΚΑΡΠΑ), για ψυχολογική ενθάρρυνση του ασθενή καθώς και για το σερβίρισμα του αποστειρωμένου υλικού προς τους ιατρούς