



Αρ. Πρωτοκόλλου 32	Έκδοση 1 <sup>η</sup>	Σεπτέμβριος 2011	Σελίδα 1 από 2
--------------------	-----------------------	------------------	----------------

**ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**  
**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ**

Συντάχθηκε από ομάδα εργασίας	Θεοχάρη Μπήδιου Ζ. Κουπαράνης Α. Πολίτου Α.
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας	Κοκώνη Κουτσιαντά - Ζαμπόκα
Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας	Φανή Αθανασιάδου- Πιπεροπούλου Καθηγήτρια Παιδιατρικής Α.Π.Θ
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου	Δημήτριος Γρέκας Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ
Διοικητής & Πρόεδρος Δ.Σ Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ	Γεώργιος Βέργουλας

Απόφαση Δ.Σ: Συνεδρίαση 19<sup>η</sup> της 30/08/2011  
Θέμα 49<sup>ο</sup>

Κάθε αντίγραφο του παρόντος εγγράφου ισχύει μόνο  
όταν φέρει την σφραγίδα της πηγής προέλευσης:  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ

**ΥΛΙΚΑ**

1. 20ml xylocaine 2%
2. 5.000i.u. heparine
3. Ιματισμός αποστειρωμένος
4. 1lit 0.9 N/S
5. 50ml ιωδιούχο διάλυμα (betadine)
6. Σύριγγες
7. Σετ εργαλείων βηματοδότη – απινιδωτή
8. Αδιάβροχα πεδία για χειριστήρια και λυχνία
9. Ράμματα ( 2/0 silk, 2/0 pga, -0- silk)
10. Καλώδιο σύνδεσης με προσωρινό – εξωτερικό βηματοδότη
11. Διαθερμία μιας χρήσεως

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1.	Παραλαβή ασθενή, ταυτοποίηση στοιχείων.	Για αποφυγή λάθους.
2.	Προετοιμασία (τοποθέτηση στο κρεβάτι, ευπρεπισμός, φλεβοκέντηση – ορός iv, σύνδεση με ECG, ψυχολογική ενθάρρυνση).	Για την διενέργεια της βαλβιδοπλαστικής. Για μείωση του άγχους.
3.	Παρακέντηση κερκιδικής αρτηρίας (μόνο σε τοποθέτηση απινιδωτή).	Για αιματηρή μέτρηση αρτηριακής πίεσης.
4.	*Αποστείρωση πεδίου (χλωρεξιδίνη, ιωδιούχο μείγμα) περιοχή τραχήλου(ΑΡ) και ημιθωρακίου (ΑΡ) και «σκέπασμα» ασθενή με αποστειρωμένο ιματισμό (τετράγωνα πράσινα, αδιάβροχα).	Δημιουργία χειρουργικού πεδίου.
5.	Στρώσιμο χειρουργικού τραπεζιού (2 άτομα).	Για τη διασφάλιση άσηπτων συνθηκών.
6.	*Διενέργεια εμφύτευσης	
7.	Χορήγηση φαρμάκων, σερβίρισμα επιπλέον υλικών (συσσκευή βηματοδότη – απινιδωτή, θηκάρι υποκλειδίου αρτηρίας).	Ανάλογα με τις ανάγκες της επέμβασης και τα συμπτώματα του ασθενή.
8.	Παρακολούθηση ζωτικών σημείων του ασθενή (κλινικά + monitor).	Παροχή πρώτων βοηθειών (εφόσον χρειαστεί).
9.	*Έλεγχος σταθεροποίησης των καλωδίων και λειτουργίας της εμφυτεύσιμης συσκευής.	Για αποφυγή επαναδιάνοιξης του ασθενή.
10.	Πιεστική επίδεση τραύματος. Καθαρισμός τραπεζιού, συμμάζεμα χώρου του εργαστηρίου. Έξοδος ασθενή από το εργαστήριο.	Για αποφυγή αιμορραγίας λόγω μετακίνησης του ασθενή, δημιουργίας αιματώματος. Προετοιμασία χώρου για την υποδοχή νέου αρρώστου.
11.	Καθ'όλη τη διάρκεια της βαλβιδοπλαστικής παραμένουμε εντός του εργαστηρίου (με προστατευτική μολύβδινη ποδιά).	Για έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών (κοιλιακή μαρμαρυγή, διασωλήνωση, ΚΑΡΠΑ), για ψυχολογική ενθάρρυνση του ασθενή καθώς και για το σερβίρισμα του αποστειρωμένου υλικού προς τους ιατρούς.